GUIA EDUCATIVO • PRIMEIRAS SEMANAS DE TRATAMENTO

“Apliquei tirzepatida há dois dias e não senti nada. O medicamento não funciona?”

Quarenta e oito horas sem perceber redução do apetite não bastam para concluir que o medicamento falhou. A bula aprovada pela FDA e duas instituições de referência, nos Estados Unidos e na Inglaterra, explicam por quê.

TEXTO
Dr. W. Scott Butsch

REVISÃO TÉCNICA
Cleveland Clinic Health Essentials

ATUALIZADO EM
3 de novembro de 2026

LEITURA
5 minutos · 4 fontes




Ilustração editorial com base na bula de Zepbound (FDA): com aplicações semanais, as concentrações de tirzepatida se estabilizam após cerca de 4 semanas.[3] A intensidade das cores é simbólica, não uma medida.

A RESPOSTA CURTA

Não tire conclusões precipitadas. Algumas pessoas percebem redução da fome rapidamente; outras levam semanas para notar os efeitos. Sentir fome 48 horas depois da aplicação não significa, por si só, que o medicamento perdeu potência ou que o tratamento falhou.

PONTOS-CHAVE

- O pico no sangue ocorre, em mediana, 24 horas após a aplicação, variando de 8 a 72 horas.
- A concentração se estabiliza após cerca de 4 semanas.
- A dose de 2,5 mg é de início, não de manutenção.
- Perceber menos fome pode levar semanas ou meses.
- 48 horas não testam potência nem qualidade.

NESTE ARTIGO

1. O que a bula estabelece
2. Duas instituições de referência
3. O organismo não é um cronômetro
4. O que 48 horas não provam

TIPO DE FONTE

BULA OFICIAL
Documento aprovado pela autoridade regulatória.

ORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Material de hospital ou centro médico para pacientes.

OPINIÃO DE ESPECIALISTA
Experiência clínica; não substitui dados de estudos.

01 BULA OFICIAL · FDA

O que a bula aprovada pela FDA estabelece

A bula americana de Zepbound, revisada em agosto de 2026, traz os dados farmacológicos que ajudam a entender o ritmo das primeiras semanas.[3]

24 h
Pico no sangue
Tempo mediano até a concentração máxima após uma aplicação, com variação de 8 a 72 horas.

5–6 dias
Meia-vida
Em pessoas com sobrepeso ou obesidade. É o que permite a aplicação semanal.

4 semanas
Concentração estável
Período para atingir o estado de equilíbrio com aplicações semanais.

2,5 mg
Dose de início

Usada por 4 semanas para iniciar o tratamento. Não é aprovada como dose de manutenção.	

Fonte: Zepbound (tirzepatida), bula americana, seções 2.1 e 12.3, revisão 8/2026.[3] Aumentos de dose ocorrem em etapas de 2,5 mg, após pelo menos 4 semanas na dose atual, a critério do prescritor.

O ponto central: concentração no sangue não é o mesmo que percepção de saciedade. O medicamento está sendo absorvido e se acumulando antes que muitas pessoas sintam qualquer diferença no apetite.

E a dose de 2,5 mg existe principalmente para que o organismo se adapte com menos efeitos gastrointestinais. Não é a dose em que se espera o efeito pleno.

02 ORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ESPECIALISTA

O que dizem duas instituições de referência

Cleveland Clinic, Estados Unidos

Artigo "How Fast Do GLP-1 Drugs Suppress Appetite?", *Health Essentials*, agosto de 2025[1]

O médico W. Scott Butsch, especialista em medicina da obesidade, explica que a pessoa pode não perceber mudança no apetite após a primeira dose e que isso pode levar algumas semanas.

> *"Sabemos que, com medicamentos, pode ser necessário tomar várias doses para alcançar o efeito completo."*

Dr. W. Scott Butsch, Cleveland Clinic. Tradução livre do original: *"We know with medications that it can take several doses to have a full effect."*

No mesmo artigo, ele acrescenta, em tradução livre:

- "Você pode não notar mudança no apetite após a primeira dose."
- "A dose inicial do medicamento pode não ter nenhum efeito."
- "Pode ser necessário continuar aumentando a dose antes de ver um efeito."

Uma nuance

O mesmo especialista diz que essas injeções semanais costumam atingir efetividade máxima em cerca de 72 horas. A bula indica pico no sangue com mediana de 24 horas. As duas informações não se contradizem: uma fala de concentração no sangue, a outra de efeito percebido, e ambas variam de pessoa para pessoa.

Cambridge University Hospitals (NHS), Inglaterra

Folheto ao paciente "Your obesity treatment: tirzepatide (Mounjaro®)", documento 107356, aprovado em abril de 2026[2]

O guia oficial do hospital para pacientes é direto sobre a tirzepatida:

> *"A tirzepatida começa a agir logo após a primeira aplicação. No entanto, pode levar várias semanas ou meses até que você perceba redução do apetite ou perda de peso."*

Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust. Tradução livre do original: *"Tirzepatide starts working right after you inject your first dose. However, it might take several weeks or months before you notice a decrease in appetite or any weight loss."*

LEIA TAMBÉM

Seu corpo, seu ritmo: por que não comparar sua resposta à tirzepatida com a de outra pessoa.

O folheto também descreve o aumento gradual: começa com 2,5 mg por semana, com aumentos a cada quatro semanas, até a dose mais eficaz para cada pessoa, com máximo de 15 mg em 20 semanas ou mais.

03 NA PRÁTICA

O organismo não responde a um cronômetro

A resposta depende da dose, do tempo de tratamento e das características de cada pessoa. Sentir o efeito não é a mesma coisa que o medicamento estar agindo.

Nos primeiros dias

- Mantenha o esquema semanal combinado com o médico.
- Faça refeições equilibradas, com proteínas e fibras.
- Anote apetite, sintomas e peso para levar à consulta.
- Se esquecer uma aplicação: dentro de 4 dias (96 horas), aplique assim que lembrar; depois disso, pule a dose.

Não sentir nada não é motivo para

- Aumentar a dose por conta própria.
- Antecipar a próxima aplicação.
- Aplicar dose dobrada.
- Abandonar o tratamento sem falar com o médico.

Orientações sobre dose esquecida conforme a bula de Zepbound[3] e o folheto do Cambridge University Hospitals.[2] Entre duas aplicações, respeite pelo menos 3 dias (72 horas).

04 RESSALVA ESSENCIAL

O que 48 horas não conseguem provar

A ausência de efeito percebido em dois dias não é um teste confiável de potência ou de eficácia. Isso vale nos dois sentidos.

NÃO PROVA QUE FALHOU

Ainda sentir fome após 48 horas é compatível com o início normal do tratamento.

TAMBÉM NÃO PROVA QUALIDADE

Composição, concentração, esterilidade e conservação precisam ser asseguradas de forma independente da sensação do paciente.

Quando vale investigar: se, após várias semanas na dose de manutenção, não houver nenhuma mudança de apetite, peso ou medidas, converse com o médico. Informe também o lote do produto utilizado, para que a origem e a qualidade possam ser verificadas.

A MENSAGEM MAIS IMPORTANTE

Não sentir nada nos primeiros dias não é motivo para aumentar a dose, antecipar aplicações ou desacreditar o tratamento.

Isso é uma maratona, não uma corrida de um dia só.

Referências

1. Cleveland Clinic. How Fast Do GLP-1 Drugs Suppress Appetite? *Health Essentials*, 28 ago. 2025. Entrevistado: W. Scott Butsch, MD.
2. Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust. Your obesity treatment: tirzepatide (Mounjaro®). Informação ao paciente, documento 107356, versão 1, abr. 2026.
3. Eli Lilly and Company / FDA. Zepbound (tirzepatide): Prescribing Information, seções 2 e 12.3, revisão 8/2026. Também disponível no DailyMed.
4. Caderno de Evidências. Seu corpo, seu ritmo: por que não comparar sua resposta à tirzepatida com a de outra pessoa. 8 nov. 2026.

Sobre as citações: as falas e orientações foram traduzidas livremente do inglês; os originais estão indicados. As instituições citadas não endossam produtos, marcas ou empresas.

Aviso de responsabilidade médica: conteúdo exclusivamente educativo, que não substitui consulta, prescrição ou acompanhamento médico individualizado. As informações referem-se a formulações de tirzepatida aprovadas por autoridades regulatórias. Não demonstram, por si só, eficácia, qualidade ou segurança equivalentes de formulações não avaliadas ou de produtos sem comprovação regulatória apropriada.